

【腎細胞癌レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
オブジーボ（2週毎）	オブジーボ：240mg/body/D1（30分）	14日	最小度リスク	－
オブジーボ（4週毎）	オブジーボ：480g/body/D1（30分）	28日	最小度リスク	－
オブジーボ（2週毎）＋カボメティクス	オブジーボ：240mg/body/D1（30分） カボメティクス錠40mg/body内服併用	14日	最小度リスク	－
オブジーボ（4週毎）＋カボメティクス	オブジーボ：480mg/body/D1（30分） カボメティクス錠40mg/body内服併用	28日	最小度リスク	－
オブジーボ＋ヤーボイ	オブジーボ：240mg/body/D1（30分） ヤーボイ：1mg/kg/D1（30分） 4コース後、オブジーボ単剤へ	21日	最小度リスク	－
キイトルーダ（3週毎）＋レンビマ	キイトルーダ：200mg/body/D1 レンビマカプセル20mg/body併用	21日	最小度リスク	
キイトルーダ（6週毎）＋レンビマ	キイトルーダ：400mg/body/D1 レンビマカプセル20mg/body併用	42日	最小度リスク	
バベンチオ＋インライタ	バベンチオ：10mg/kg/D1（1時間） インライタ錠内服併用	14日	最小度リスク	カロナール500mg レスタミン3錠
バベンチオ（維持療法）	バベンチオ：10mg/kg/D1（1時間） （プラチナ製剤を含む一次化学療法4～6コース後）	14日	最小度リスク	カロナール500mg レスタミン3錠