

【尿路上皮癌レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
GDC	ゲムシタビン：1000mg/m ² /D1, 8（30分） ドセタキセル：75mg/m ² /D1（60分） カルボプラチン：AUC5/D1（60分）	21日	中等度リスク （高度に準じた）	—
GEM+CBDC A	ゲムシタビン：1000mg/m ² /D1, 8（30分） カルボプラチン：AUC5/D1（30分）	21日	中等度リスク （高度に準じた）	—
GEM+CDDP	ゲムシタビン：1000mg/m ² /D1, 8, 15（30分） シスプラチン：70mg/m ² /D2（2時間）	28日	高度リスク	—
MEC	メソトレキセート：30mg/m ² /D1, 15（30分） エピルビシン：50mg/m ² /D1（全開で） シスプラチン：100mg/m ² /D2（3時間）	28日	高度リスク	—
M-VAC	メソトレキセート：30mg/m ² /D1, 15, 22（30分） プレオマイシン：3mg/m ² /D2, 15, 22（30分） ドキシソルビシン：30mg/m ² /D2（30分） シスプラチン：70mg/m ² /D2（3時間）	28日	高度リスク	—
オブジーボ（尿路・2週毎・術後補助）	オブジーボ：240mg/body/D1（30分）	14日	最小度リスク	—
オブジーボ（尿路・4週毎・術後補助）	オブジーボ：480mg/body/D1（30分）	28日	最小度リスク	—
キイトルーダ（3週毎）	キイトルーダ：200mg/body/D1（30分）	21日	最小度リスク	—
キイトルーダ（6週毎）	キイトルーダ：400mg/body/D1（30分）	42日	最小度リスク	—
パドセブ	パドセブ：1.25mg/kg/D1, 8, 25（30分） （最大125mg/body）	28日	軽度リスク	—