

【頭頸部癌レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
CBDCA+5FU+Cet	アービタックス：（初回）400mg/m ² /D1（2時間） （2回目以降）250mg/m ² /毎週（60分） カルボプラチン：AUC5/D1（1時間） フルオロウラシル：800mg/m ² /D1-5（24時間持続） 6コース	21日	中等度リスク	レスタミン錠5錠
CBDCA+UFT+RT	カルボプラチン：AUC 1-1.25/D1（1時間） UFT：300mg/body/D1-7 放射線照射併用	7日	中等度リスク	-
CDDP+5FU+Cet	アービタックス：（初回）400mg/m ² /D1（2時間） （2回目以降）250mg/m ² /毎週（60分） シスプラチン：80mg/m ² /D1（2時間） フルオロウラシル：800mg/m ² /D1-5（24時間持続） 6コース	21日	高度リスク	レスタミン錠5錠
Cet（隔週）	アービタックス：500mg/m ² /D1（2時間）	14日	最小度リスク	レスタミン錠5錠
Cet+PTX	アービタックス：（初回）400mg/m ² /D1（2時間） （2回目以降）250mg/m ² /毎週（60分） パクリタキセル：80mg/m ² /D1（1時間）	7日	軽度リスク	レスタミン錠5錠
Cet+PTX+CBDCA（1コース目）	アービタックス：（初回）400mg/m ² /D1（2時間） （2回目以降）250mg/m ² /毎週（60分） パクリタキセル：100mg/m ² /D1, 8（1時間） カルボプラチン：AUC2.5/D1, 8（30分） 6コース（以後アービタックス単剤）	21日	中等度リスク	レスタミン錠5錠
Cet+RT	アービタックス：（初回）400mg/m ² /D1（2時間） （2回目以降）250mg/m ² /毎週（60分） 放射線照射併用 8コース	7日	最小度リスク	レスタミン錠5錠
DOC+CBDCA+RT	ドセタキセル：10mg/m ² /D1（30分） カルボプラチン：AUC0.4/D1-5（1時間） 放射線照射併用	7日	中等度リスク	-
DOC+RT（3週毎）	ドセタキセル：70mg/m ² /D1（1時間） 放射線照射併用	21日	軽度リスク	-
DOC+RT（毎週）	ドセタキセル：10mg/m ² /D1（30分） 放射線照射併用	7日	軽度リスク	-
weeklyPTX（80mg/m ² ・甲状腺癌）	パクリタキセル：80mg/m ² /D1, 8, 15（1時間）	21日	軽度リスク	レスタミン錠5錠
weeklyPTX（100mg/m ² ）	パクリタキセル：100mg/m ² /D1, 8, 15, 22, 29, 36（1時間）	42日	軽度リスク	レスタミン錠5錠
オブジーボ（2週毎）	オブジーボ：240mg/body/D1（30分）	14日	最小度リスク	-
オブジーボ（4週毎）	オブジーボ：240mg/body/D1（30分）	28日	最小度リスク	-
キイトルーダ（3週毎）	キイトルーダ：200mg/body/D1（30分）	21日	最小度リスク	-
キイトルーダ（6週毎）	キイトルーダ：400mg/body/D1（30分）	42日	最小度リスク	-