

## 【白血病レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
VP（初回治療）	オンコピン：1. 25mg/m <sup>2</sup> /D1, 8, 15, 22（全開で） プレドニゾン錠：40mg/m <sup>2</sup> /D1-28（内服）	28日	最小度リスク	—
VcrP（寛解後維持）	オンコピン：1. 25mg/m <sup>2</sup> /D1（全開で） プレドニゾン錠：40mg/m <sup>2</sup> /D1-7（内服）	7日	最小度リスク	—
ガザイバ+カルケンス（1コース目）	ガザイバ：100mg/body/D1 900mg/body/D2 1000mg/body/D8, 15 カルケンス：200mg/日（内服） （カルケンス単剤で28日服用後併用療法開始）	28日	最小度リスク	カロナール600mg レスタミン5錠
ガザイバ+カルケンス（2～6コース目）	ガザイバ：1000mg/body/D1 カルケンス：200mg/日（内服） （6コース終了後カルケンス単剤で継続）	28日	最小度リスク	カロナール600mg レスタミン5錠
トリセノックス	トリセノックス：0. 15mg/body （寛解後：1日1回・5週間で計25回）	—	最小度リスク	—