

【食道癌レジメン】

【食道癌レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
DOC	ドセタキセル：70mg/m ² /D1（60分）	21日	軽度リスク	－
mFOLFOX6	オキサリプラチン：85mg/m ² /D1（2時間） レボホリナート：200mg/m ² /D1（2時間） フルオロウラシル：400mg/m ² /D1（ボラス） フルオロウラシル2400mg/m ² /D1（46時間）	14日	中等度リスク	－
weeklyPTX	パクリタキセル：100mg/m ² /D1, 8, 15（60分）	28日	軽度リスク	レスタミン錠5錠
アクプラ	アクプラ：100mg/m ² /D1（2時間）	28日	中等度リスク	－
オブジーボ（2週毎・術後補助）	オブジーボ：240mg/body/D1（30分） 2週毎8コース、その後4週毎（最長1年間）	14日	最小度リスク	－
オブジーボ（4週毎・術後補助）	オブジーボ：480mg/body/D1（30分） 2週毎8コース、その後4週毎（最長1年間）	28日	最小度リスク	－
オブジーボ（2週毎・二次治療以降）	オブジーボ：240mg/body/D1（30分）	14日	最小度リスク	－
オブジーボ（4週毎・二次治療以降）	オブジーボ：480mg/body/D1（30分）	28日	最小度リスク	－