

## 【胃癌レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
BiweeklyCPT-11	イリノテカン：150mg/m <sup>2</sup> /D1（90分）	14日	中等度リスク	－
CapeOX	オキサリプラチン：130mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） カペシタビン：2000mg/m <sup>2</sup> /D1-14	21日	中等度リスク	－
CapeOX+Her（CDDP不適患者用）	カペシタビン：2000mg/m <sup>2</sup> /D1-14 オキサリプラチン：130mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） トラスツズマブ：（初回）8mg/kg/D1（90分） （2回目以降）6mg/kg/D1（30分）	21日	中等度リスク	－
CapeOX+オブジーボ（HER2陰性）	カペシタビン：2000mg/m <sup>2</sup> /D1-14 オキサリプラチン：130mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） オブジーボ：360mg/body/D1（30分）	21日	中等度リスク	－
CDDP（D8）+S-1	S-1：80mg/m <sup>2</sup> /D1-21 シスプラチン：60mg/m <sup>2</sup> /D8（2時間）	35日	高度リスク	－
CPT-11+CDDP	イリノテカン：70mg/m <sup>2</sup> /D1，15（90分） シスプラチン：80mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間）	28日	高度リスク	－
CPT-11+S1	イリノテカン：80mg/m <sup>2</sup> /D1，15（90分） S-1：80mg/m <sup>2</sup> /D1-21	28日	中等度リスク	－
DCS	S-1：80mg/m <sup>2</sup> /D1-14 シスプラチン：60mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） ドセタキセル：40mg/m <sup>2</sup> /D1（60分）	28日	高度リスク	－
DOC（60）	ドセタキセル：60mg/m <sup>2</sup> /D1（60分）	21日	軽度リスク	－
DOC+S1	ドセタキセル：40mg/m <sup>2</sup> /D1（90分） S-1：80mg/m <sup>2</sup> /D1-14	21日	軽度リスク	－
DOC+フルツロン	ドセタキセル：40mg/m <sup>2</sup> /D1（60分） フルツロン：600mg/m <sup>2</sup> /D1-14	14日	軽度リスク	－
HERBIS-1	S-1：80mg/m <sup>2</sup> /D1-14 シスプラチン：60mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） トラスツズマブ：（初回）8mg/kg/D1（90分） （2回目以降）6mg/kg/D1（30分）	21日	高度リスク	－
I-LV+5FU	レボホリナート：250mg/m <sup>2</sup> /D1,8,15,22,29,36（2時間） フルオロウラシル：600mg/m <sup>2</sup> /D1,8,15,22,29,36（ポーラス）	49日	軽度リスク	－
mFOLFOX6	オキサリプラチン：85mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） レボホリナート：200mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） フルオロウラシル：400mg/m <sup>2</sup> /D1（ポーラス） フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> /D1（46時間）	14日	中等度リスク	－
mFOLFOX6+オブジーボ（HER2陰性）	オキサリプラチン：85mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） レボホリナート：200mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） フルオロウラシル：400mg/m <sup>2</sup> /D1（ポーラス） フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> /D1（46時間） オブジーボ：240mg/body/D1（30分）	14日	中等度リスク	－

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
MTX+5FU	メソトレキセート：100mg/m <sup>2</sup> /D1（ボーラス） フルオウラシル：600mg/m <sup>2</sup> /D1（ボーラス） ロイコポリン：10mg/m <sup>2</sup> （MTX投与後24時間から6回）	7日	軽度リスク	－
SOX	オキサリプラチン：130mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） S-1：80mg/m <sup>2</sup> /D1-14	21日	中等度リスク	－
SOX+Her（CDDP不適患者用）	オキサリプラチン：130mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） S-1：80mg/m <sup>2</sup> /D1-14 トラスツズマブ：（初回）8mg/kg/D1（90分） （2回目以降）6mg/kg/D1（30分）	21日	中等度リスク	－
SOX+オプジーボ（HER2陰性）	オキサリプラチン：130mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） S-1：80mg/m <sup>2</sup> /D1-14 オプジーボ：360mg/body/D1（30分）	21日	中等度リスク	－
weeklyPTX	パクリタキセル：80mg/m <sup>2</sup> /D1, 8, 15（60分）	28日	軽度リスク	レスタミン錠5錠
weeklyアブラキサン	アブラキサン：100mg/m <sup>2</sup> /D1, 8, 15（30分）	28日	軽度リスク	－
wPTX+S1	パクリタキセル：50mg/m <sup>2</sup> /D1, 8（60分） S-1：80mg/m <sup>2</sup> /D1-14	21日	軽度リスク	レスタミン錠5錠
wPTX+サイラムザ	パクリタキセル：80mg/m <sup>2</sup> /D1, 8, 15（60分） サイラムザ：8mg/kg/D1, 15（60分）	28日	軽度リスク	レスタミン錠5錠
wPTX+フルツロン	パクリタキセル：50mg/m <sup>2</sup> /D1, 8（60分） フルツロン：600mg/m <sup>2</sup> /D1-14	21日	軽度リスク	－
アブラキサン	アブラキサン：260mg/m <sup>2</sup> /D1（30分）	21日	軽度リスク	－
アブラキサン+サイラムザ	アブラキサン：100mg/m <sup>2</sup> /D1, 8, 15（30分） サイラムザ：8mg/kg/D1, 15（60分）	28日	軽度リスク	レスタミン錠5錠 （サイラムザ投与時）
エンハーツ	エンハーツ：6.4mg/kg/D1（30分（初回90分））	21日	中等度リスク	－
オプジーボ（2週毎・三次治療以降）	オプジーボ：240mg/body/D1（30分）	14日	最小度リスク	－
オプジーボ（4週毎・三次治療以降）	オプジーボ：480mg/body/D1（30分）	28日	最小度リスク	－
カペシタビン+CDDP（XP）	カペシタビン：2000mg/m <sup>2</sup> /D1-14 シスプラチン：80mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間）	21日	高度リスク	－
カペシタビン+CDDP（XP）+3週毎HER	カペシタビン：2000mg/m <sup>2</sup> /D1-14 シスプラチン：80mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） トラスツズマブ：（初回）8mg/kg/D1（90分） （2回目以降）6mg/kg/D1（30分）	21日	高度リスク	－
サイラムザ	サイラムザ：8mg/kg/D1（60分）	14日	最小度リスク	レスタミン錠5錠